

LIPOLIZA INIEKCYJNA

Lipoliza iniekcyjna to niechirurgiczna metoda redukcji tkanki tłuszczowej polegająca na wstrzykiwaniu substancji bezpośrednio w tkankę tłuszczową w określonym obszarze ciała. Miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej może wynikać z uwarunkowań konstytucjonalnych, genetycznych, hormonalnych, jatrogennych, zależy od płci, wieku, a także aktywności fizycznej i diety.

Lipoliza iniekcyjna została po raz pierwszy na świecie opisana w roku 1959 roku.

Zabieg polega na iniekcjach preparatu, którego głównym składnikiem jest fosfatydylocholina, pochodna lecytyny otrzymywana z soi, która rozpuszcza błonę komórkową adipocytów (komórek tkanki tłuszczowej), łatwo przenika do wnętrza komórek doprowadzając do rozpadu nagromadzonych w nich trójglicerydów, a następnie transportuje je do wątroby, gdzie następuje ich metabolizm i wydalenie z organizmu. W połączeniu z fosfatydylocholiną działa kwas dezoksychołowy, który pełni funkcję detergentu rozpuszczającego tłuszcz i niszczącego błony komórek.

Wskazania: Jest to metoda bardzo efektywna w lokalnych nagromadzeniach tkanki tłuszczowej, które trudno zlikwidować dietą i ćwiczeniami fizycznymi: na brzuchu, biodrach, udach, okolicach pośladków, nad kolanami, na plecach, w okolicach pach, na ramionach oraz na twarzy w przypadku tzw drugiego podbródka, w obrębie bruzd nosowo-wargowych, na policzkach oraz w usuwaniu tłuszczaków.

Przeciwwskazania: alergia na preparaty soi, ciąża i laktacja, wiek poniżej 18 r.ż., cukrzyca z zaburzeniami naczyniowymi, choroby autoimmunologiczne, choroby wątroby i nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, miesiączka, infekcje skóry w obszarze poddawany zabiegowi

Przed zabiegiem nie należy przyjmować aspiryny, leków zmniejszających krzepnięcie krwi, przeciwzapalnych.

Po zabiegu: może wystąpić zaczerwienienie, miejscowa bolesność, swędzenie, niewielki obrzęk w miejscach wkłucia, nadwrażliwość na dotyk i ucisk.

Można stosować chłodzące okłady, zastosować środki przeciwbólowe wskazane przez lekarza, przez pierwsze 3-5 dni po zabiegu należy pić 2 litry wody.

Efekt po jednym zabiegu w postaci zmniejszenia obwodów jest widoczny po 2 tygodniach (pełny efekt po kilku tygodniach), zdarza się, że po 1-2 zabiegach efekt jest wystarczający. W przypadku większej ilości tkanki tłuszczowej zabiegi przeprowadza się w serii.

Koszt zabiegu z wykorzystaniem 1 ampułki wynosi 500 zł
